

## Ergänzungsfuttermittel für Rinder

(D)

**Zusammensetzung:** Hefe (inaktive *Saccharomyces cerevisiae*), Getreideschlempe (getrocknet), Sojaöl

**Analytische Bestandteile und Gehalte:** Rohprotein 18,71 %, Rohfett 4,33 %, Rohfaser 1,51 %, Rohasche 48,08 %, HCl-unlösliche Asche 40,15 %, Natrium 0,05 %, Phosphor 0 %

**Zusatzstoffe je kg: Darmflorastabilisatoren:**

4b1702 *Saccharomyces cerevisiae* (CNCM I-4407) 2000 x 10<sup>9</sup> KBE

**Stoffe zur Verringerung der Kontamination von Futtermitteln mit Mykotoxinen:** 1m558\* Bentonit 500 000 mg

**Aromastoffe:** Mischung aus Aromastoffen\*\* 10 000 mg

### Fütterungshinweis:

Milchkühe: 20 g je Tier und Tag

Mastrinder: 35 g je Tier und Tag

Aufzuchtkälber: 10 g je Tier und Tag

\*Die gleichzeitige orale Verwendung von Makroliden ist zu vermeiden

\*\*enthält natürliche Antioxidantien (Phenole)

**Lagerhinweis:** Kühl und trocken lagern.

### Kennzeichnung zur Berechnung der Stoffstrombilanz:

3,18 % N als Gesamtstickstoff, 0 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>

## Aanvullend diervoeder voor runderen

(NL)

**Samenstelling:** gist (inactieve *Saccharomyces cerevisiae*), graanbostel (gedroogd), sojaolie

**Analytische bestanddelen en gehalten:** ruwe proteïne 18,71 %, ruw vet 4,33 %, ruwe vezels 1,51 %, ruwe as 48,08 %, HCl-onoplosbaar as 40,15 %, natrium 0,05 %, fosfor 0 %

**Additieven per kg: Darmflorastabilisatoren:**

4b1702 *Saccharomyces cerevisiae* (CNCM I-4407) 2000 x 10<sup>9</sup> kve

**Stoffen ter reducering van besmetting van voermiddelen door mycotoxines:** 1m558\* bentoniet 500 000 mg

**Aromastoffen:** mengsel uit aromatische stoffen\*\* 10 000 mg

### Voerinstructie:

Melkkoeien: 20 g per dier en dag

Mestrunderen: 35 g per dier en dag

Opfokkalveren: 10 g per dier en dag

\*Het gelijktijdige orale gebruik van macroliden moet vermeden worden

\*\*bevat natuurlijke antioxidantien (fenolen)

**Opslaginstructie:** Koel en droog opslaan.

3,18 % N in zijn totaliteit, 0 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>

## Uzupełniająca mieszanka paszowa dla bydła

(PL)

**Skład:** drożdże (nieaktywne *Saccharomyces cerevisiae*), wywar zbożowy (suszony), olej sojowy

**Składniki i ich zawartość:** białko ogólne 18,71 %, tłuszcz surowy 4,33 %, włókno surowe 1,51 %, popiół surowy 48,08 %, popiół nierozpuszczalny w HCl 40,15 %, sól 0,05 %, fosfor 0 %

**Dodatki na kg: Stabilizatory flory jelitowej:**

4b1702 *Saccharomyces cerevisiae* (CNCM I-4407) 2000 x 10<sup>9</sup> jtk

**Dodatki zmniejszające zanieczyszczenie paszy mykotoksynami:**

1m558\* bentonit 500 000 mg

**Substancje aromatyzujące:** mieszanka aromatów\*\* 10 000 mg

### Dozowanie:

Krowy mleczne: 20 g/zwierzę/dzień

Bydło opasowe: 35 g/zwierzę/dzień

Odchow cieląt: 10 g/zwierzę/dzień

\*Stosując Orgacell sc mb nie należy jednocześnie podawać makrolidów

\*\*zawiera naturalne przeciwutleniacze (fenole)

### Przechowywanie:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

3,18 % N jako całkowity N, 0 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>

pastus<sup>®</sup> AMA-Gütesiegel tauglich



**Chargennr.:** \_\_\_\_\_  
**Herstelldatum:** \_\_\_\_\_  
**Mindestens haltbar bis:** \_\_\_\_\_  
**Rezepturnummer:** 202111/00769/04

Zulassungsnr. Hersteller: aDE Ni 400036  
 QS-ID: 4031735000511

**Nettomasse:**

**20 kg**

(batch / nr partii)  
 (productiedatum / data produkcji)  
 (ten minste houdbaar tot / data trwałości)  
 (product-nr. / nr produktu)

(registratienummer / nr zezwolenia)

(netto massa / masa netto)

